

**Allegato C1 - Tabella riassuntiva delle condizioni di rischio e delle vaccinazioni indicate**

Condizioni di rischio	S. Pneumoniae		N. Meningitidis		HIB	Influenza	Varicella
	PVC13 *	PPV23	Men A,C,W,Y	Men B			
Asplenia anatomica o funzionale	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi	2 dosi a distanza di almeno 8 settimane. Un richiamo ogni 5 anni	Ciclo completo e dosi di richiamo secondo l'età	1 dose se non già vaccinato	1 dose annuale	
Immunodeficienza congenita e acquisita (compreso HIV)	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi	2 dosi a distanza di almeno 8 settimane.	Ciclo completo e dosi di richiamo secondo l'età	1 dose se non già vaccinato	1 dose annuale	2 dosi a distanza di almeno 4 settimane alle <b>persone con infezione da HIV</b> senza segni di immunodeficienza e con una proporzione di CD4 $\geq$ 200/ml
Deficit fattori del complemento (C5-C9), difetti dei toll like receptors di tipo 4 e della properidina	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi	2 dosi a distanza di almeno 8 settimane. Un richiamo ogni 5 anni	Ciclo completo e dosi di richiamo secondo l'età	1 dose se non già vaccinato		
Emoglobinopatie (in particolare anemia falciforme e talassemia in quanto causa di asplenia funzionale)	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi	2 dosi a distanza di almeno 8 settimane.	Ciclo completo e dosi di richiamo secondo l'età	1 dose se non già vaccinato	1 dose annuale	
Trapianto di midollo osseo	3 dosi più 1 in presenza di GvHD cronica	1 dose a distanza di 12 mesi	2 dosi a distanza di almeno 8 settimane.	Ciclo completo e dosi di richiamo secondo l'età	3 dosi con un intervallo di 2 mesi tra ogni singola dose	1 dose annuale	
Trapianto di organi solidi	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi	1 dose		1 dose se non già vaccinato	1 dose annuale	
Condizioni con immunodepressione (come trapianto d'organo o terapia antineoplastica, compresa la terapia corticosteroidea sistemica ad alte dosi)	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi	1 dose		1 dose se non già vaccinato	1 dose annuale	
Perdite di liquor da cause congenite o acquisite	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi	1 dose				

## Allegato C1 - Tabella riassuntiva delle condizioni di rischio e delle vaccinazioni indicate

Condizioni di rischio	S. Pneumoniae		N. Meningitidis		HIB	Influenza	Varicella
	PVC13 *	PPV23	Men A,C,W,Y	Men B			
Portatori di impianto cocleare	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi					
Insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica e trapianto renale	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi	1 dose			1 dose annuale	2 dosi a distanza di almeno 4 settimane
Leucemie, linfomi, mieloma multiplo	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi				1 dose annuale	leucemia linfatica acuta in remissione: 2 dosi a distanza di almeno 4 settimane
Neoplasie diffuse	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi				1 dose annuale	
Malattie polmonari croniche che comportano insufficienza respiratoria e fibrosi cistica	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi				1 dose annuale	
Diabete mellito insulinodipendente	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi				1 dose annuale	
Diabete mellito in difficile compenso	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi				1 dose annuale	
Cirrosi epatica, epatopatie croniche evolutive	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi				1 dose annuale	
Cardiopatie croniche	1 dose	1 dose a distanza di 12 mesi				1 dose annuale	

\* i soggetti ad alto rischio per la presenza di patologie croniche, se mai vaccinati in precedenza con vaccino pneumococcico polisaccaridico (PPV23) riceveranno anche una dose di PPV23 a distanza di un anno. I soggetti già vaccinati con una o più dosi di PPV23 da uno o più anni effettueranno solo una dose di PCV13.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE