

AGGIORNAMENTO DELL' OFFERTA VACCINALE E DI IMMUNIZZAZIONE PER INFANZIA E ADOLESCENZA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

	0 gg-30 gg	3° mese (61° giorno)	4° mese (91° giorno)	5° mese (121° giorno)	6° mese (151° giorno)	7° mese (181° giorno)	11° mese	13° mese	14° mese	6 anni	12° anno	13 - 18 anni
DTPa (difterite tetano pertosse)		DTPa		DTPa			DTPa			DTPa ⁴	dTpa ⁶	
IPV (poliomielite)		IPV		IPV			IPV			IPV ⁴	IPV ⁶	
HBV (epatite B)	HBV ¹	HBV		HBV			HBV					
Hib (haemophilus influenzae b)		Hib		Hib			Hib					
MPRV (morbillo, parotite, rosolia e varicella)								MPRV		MPRV		
PCV (pneumococco)		PCV ²		PCV			PCV					
Men B (meningococco B)		Men B ³			Men B				Men B			
Men Tetra (meningococco A,C,W,Y)								Men tetra ⁵			Men tetra ⁷	
Rotavirus		Rotavirus ⁸ (2 o 3 dosi)										
HPV (papillomavirus)											HPV ⁹ (2 dosi)	
Varicella												Varicella ¹⁰ (2 dosi)
Influenza					Influenza ¹¹							
TBE (encefalite da zecca)								TBE ¹²				

HAV (epatite A)								HAV ¹³	
RSV	Anticorpo monoclonale Nirsevimab ¹⁴								

AGGIORNAMENTO DELL' OFFERTA VACCINALE PER INFANZIA E ADOLESCENZA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA**Note alla tabella**

1. Nei figli di madri HBsAg positive, somministrare entro le prime 12-24 ore di vita, contemporaneamente alle Ig specifiche, la prima dose di vaccino. Il ciclo va completato con la 2a dose a distanza di 4 settimane dalla prima; a partire dalla 3° dose, che deve essere effettuata dal 61° giorno, si segue il calendario con il vaccino combinato esavalente.
2. Pneumococco coniugato 15 valente (PCV15). I Bambini che iniziano la vaccinazione nel corso del secondo anno di vita devono eseguire due dosi; qualora iniziassero nel corso del terzo anno è sufficiente una dose singola. Nel caso si tratti di bambini in condizioni di rischio sono raccomandate due dosi.
3. Meningococco di gruppo B: gratuito, presso i servizi vaccinali, fino al compimento dei 25 anni di vita anche per coloro che sono stati precedentemente vaccinati. Successivamente gratuito solo nei soggetti a rischio. La vaccinazione è offribile dal 61° giorno di vita.
4. È possibile anche utilizzare dai 4 anni la formulazione tipo adulto (dTpaIPV) a condizione che i genitori siano adeguatamente informati dell'importanza del richiamo in adolescenza e che siano garantite elevate coperture vaccinali in età adolescenziale.
5. Il vaccino tetravalente coniugato anti-meningococco ACWY sostituisce il vaccino anti-meningococco C a partire dai nati nel 2019, in cosomministrazione con vaccino anti morbillo-rosolia-parotite-varicella (MPRV)
6. Il vaccino difterite-tetano-pertosse-polio è cosomministrato con la seconda dose di HPV. I successivi richiami per difterite-tetano-pertosse devono essere effettuati ogni 10 anni.
7. Il vaccino tetravalente coniugato anti-meningococco ACWY è cosomministrato con la prima dose di vaccino anti HPV nel dodicesimo anno. La vaccinazione anti-meningococco ACWY deve essere somministrata sia a chi in passato abbia già ricevuto una dose di meningococco C, sia a chi nell'infanzia non abbia mai effettuato tale vaccinazione o chi per motivi vari abbia già ricevuto una dose di ACWY. Il diritto alla gratuità della vaccinazione antimeningococcica è esteso fino al compimento dei 25 anni di età.
8. Rotavirus: 2 o 3 dosi nel primo anno di vita, a seconda del tipo di vaccino
9. Il diritto alla gratuità della vaccinazione HPV, è esteso fino a 26 anni di età per coloro che non sono stati precedentemente vaccinati.
10. Adolescenti con anamnesi negativa per varicella. Somministrazione di due dosi a distanza di ≥ 1 mese l'una dall'altra.
11. Soggetti a rischio di età superiore ai 6 mesi di vita secondo le indicazioni contenute nella Circolare del Ministero della Salute emanata ogni anno.
12. Offerta gratuita ai residenti in Friuli Venezia Giulia, con compartecipazione alla spesa per i non residenti.
13. Bambini/ragazzi fino a 16 anni, figli di immigrati che si rechino, anche per brevi periodi di tempo nei Paesi endemici di origine
14. Durante la stagione epidemica, dal 1 ottobre al 31 marzo salvo indicazioni della Direzione Centrale Salute, a tutti i neonati prima della dimissione presso i punti nascita, tutti i lattanti con età ≤ 6 mesi presso i Servizi di vaccinazione pediatrica e a tutti i bambini di età 6 – 24 mesi con fattori di rischio: cardiopatia congenita, emodinamicamente significativa (con o senza cianosi), immunodepressione primitiva o secondaria, malattie metaboliche, malattie neuromuscolari, broncodisplasia grave (la profilassi è indicata nei bambini con broncodisplasia grave che richiedono terapia - ossigeno, corticosteroidi, diuretici - nei 6 mesi prima dell'inizio della stagione epidemica.), patologia respiratoria grave, fibrosi cistica, trisomia 21, sindromi genetiche e/o malformazioni congenite con possibile compromissione respiratoria, pazienti in cure palliative, bambino nato prematuro con storia clinica significativa su indicazione della Neonatologia di riferimento presso i servizi di vaccinazioni pediatriche o gli ospedali di riferimento. La profilassi è indicata per tutti i neonati di qualsiasi età gestazionale. Nei neonati che alla nascita richiedono un'ospedalizzazione più lunga la somministrazione deve avvenire non appena le condizioni cliniche la rendono possibile durante la degenza in ospedale.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE